

非特异性尿道炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E9\\_9D\\_9E\\_E7\\_89\\_B9\\_E5\\_BC\\_82\\_E6\\_c22\\_306187.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E9_9D_9E_E7_89_B9_E5_BC_82_E6_c22_306187.htm) 名称非特异性尿道炎

所属科室泌尿生殖外科病因非特异性尿道炎的致病菌以大肠杆菌，链球菌和葡萄球菌为最常见。非特异性尿道炎的发生除致病菌外，尚有许多诱发因素，主要的有：尿道口或尿道内的梗阻，如包茎、尿道狭窄、结石、肿瘤等妨碍尿液排出。泌尿生殖系统的感染，如前列腺炎、\*\*\*炎、宫颈炎等。

尿道内的机械性刺激，如留置导尿管，尿道内器械的应用，手淫等。女性因尿道短，且尿道口常与\*\*\*分泌物接触，轻易引起尿道炎。临床表现急性期主要是尿道灼痛，尤以排尿时为甚，尿道有脓性分泌物流出，初尿混浊。一般不引起全身症状，有时出现尿频、尿急等症状。诊断尿道炎的诊断主要根据病史及尿道分泌物的检查。男性患者可用三杯试验确定尿道炎的部位（图1）。慢性尿道炎患者须行前列腺按摩液检查。必要时可作尿道镜检或膀胱镜检以观察后尿道情况。女性患者须行妇科检查以明确有无\*\*\*炎和宫颈炎等情况。

膀胱及泌尿系感染图1 尿三杯试验治疗急性期的治疗主要是鼓励病人多饮水，以增加尿量，发挥尿液冲洗尿道的作用，并应用抗菌药物使炎症消退。慢性尿道炎的治疗除上述治疗外，尚须辅以尿道冲洗疗法，常用的有1/1000硝酸银液或0.5%~1%新霉素液等。慢性后尿道炎可经尿道镜在后尿道涂以1%硝酸银液每周1~2次。合并前列腺炎时应予以相应的治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)