

上皮样肉瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E4_B8_8A_E7_9A_AE_E6_A0_B7_E8_c22_306211.htm 名称上皮样肉瘤所属科室骨科病理

1.肉眼所见 表浅性肿瘤，1至数厘米不等，深的可与筋膜、腱等附着，切面灰白色、出血和坏死相间。

2.镜下所见 主要特征是上皮样瘤细胞作结节状排列，结节中心呈退变及坏死。瘤细胞呈多边形，肥胖梭形或大圆形，胞浆深伊红色或淡染，核圆形、染色深浅不等。亦可呈泡状，常有轻度到中度的多形性。临床表现 好发20~40岁，四肢末端多见，文献报告一半发生于手部，最初的发现是皮下1cm左右直径的无痛结节，2~3个月后破溃，出现溃疡，渐向深部浸润，沿筋膜、肌腱、神经浸润。诊断 本病的诊断三个主要特点是产生嗜银纤维的上皮样细胞，形成许多胶原纤维围绕的上皮样细胞结节，以及结节中心变性或坏死。治疗 本瘤局部复发率高，有报告达80%，另外有10%~30%的引流区淋巴结转移，所以提倡局部行广泛切除，并考虑行引流区淋巴结清扫。化疗、放疗无效，由于此瘤较少见，尚有待于临床的总结。此瘤生长缓慢，术后10年生存率达50%，也有文献报告术后23年发生肺转移尚生存的病人。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com