

骨外软骨肉瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E9\\_AA\\_A8\\_E5\\_A4\\_96\\_E8\\_BD\\_AF\\_E9\\_c22\\_306297.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E9_AA_A8_E5_A4_96_E8_BD_AF_E9_c22_306297.htm) 名称骨外软骨肉瘤  
所属科室骨科病理

1.骨外粘液型软骨肉瘤 (1) 肉眼所见 肿瘤呈多结节状，包膜完整，切面分叶状，粘胶样，可有出血，囊变区。(2) 镜下所见 细胞呈小叶状分布，在各小叶丰富的粘液状基质中，小型肿瘤细胞呈索状排列，可见到软骨母细胞，细胞嗜酸性并且有空泡状的细胞及小的浓染细胞核。

2.骨外间叶型软内肉瘤 (1) 肉眼所见 肿瘤较大，多结节状，切面灰白色鱼肉状，可有散在的小的软骨样组织。(2) 镜下所见 肿瘤由未分化的间叶细胞构成，细胞呈纺锤形，核浓染，细胞质少，可见到分化好的岛状的软骨组织，软骨中心可有钙化。

临床表现

1.骨外粘液型软骨肉瘤 多数发生在中年，平均年龄50岁左右，男多于女，大腿和膝关节上下多见，一般在肌肉深层为多。

2.骨外间叶型软内肉瘤 好发15~35岁的年轻女性，头颈部多见，另外四肢、后腹膜也可发生。

鉴别诊断

1.骨外粘液型软骨肉瘤 要和粘液型脂肪肉瘤，粘液型恶性纤维组织细胞瘤鉴别。

2.骨外间叶型软内肉瘤 要与滑膜肉瘤鉴别。

治疗

1.骨外粘液型软骨肉瘤 行肿瘤根治性切除，由于此肿瘤生长较缓慢，预后多良好。也可以发生转移。

2.骨外间叶型软内肉瘤 局部广泛切除，由于肺转移发生率高，预后不良。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)