

骨外骨肉瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E9_AA_A8_E5_A4_96_E9_AA_A8_E8_c22_306304.htm 名称骨外骨肉瘤所属科室骨科病理

1.肉眼所见 肿瘤与四周组织境界清楚，切面呈颗粒状，灰白或淡黄色，可见小出血灶。

2.镜下所见 与原发的骨肉瘤无大区别，可见异型性的骨母细胞，纺锤样细胞，多核巨细胞，骨样基质，骨及异型的软骨细胞。临床表现与骨原发的骨肉瘤不同，骨外骨肉瘤好发于40岁以上的成年人，大腿、臀部多见。

鉴别诊断 鉴别诊断需要与皮质旁骨肉瘤鉴别：X线片上肿瘤与骨膜连续的病变可见。组织学上可见到骨皮质的病变。

骨膜型骨肉瘤：X线片上可以见到骨皮质的病变，髓腔内无病变。

治疗 文献报道，大部分病人虽然经过种种治疗，但一般在诊断后2~3年死于转移。多血行转移。部分病人尚伴淋巴结转移。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com