

舌下囊肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E8\\_88\\_8C\\_E4\\_B8\\_8B\\_E5\\_9B\\_8A\\_E8\\_c22\\_306355.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E8_88_8C_E4_B8_8B_E5_9B_8A_E8_c22_306355.htm) 名称舌下囊肿所属科

室口腔科临床表现通常先起于一侧口底舌下区，增大时可扩展于对侧，有时也可扩展至颌下或同侧颌下部。囊肿位于口底粘膜的深面，呈淡黄色、半透明的柔软包块。触诊有波动感，无压痛。增长缓慢。囊肿很大时，可影响说话、吞咽甚至呼吸。如并发感染可有疼痛等炎症表现。囊肿破裂时，溢出蛋清样粘稠液体，包块消失，但可复发。治疗外科手术治疗。因袋形缝合术术后复发率高，现已废弃不用。目前采用的手术方法为切除舌下腺和邻近腺体的囊壁，清除囊肿，可达根治目的。手术方法：在局麻下，于舌下皱壁的外侧，沿导管走行的方向，前至下颌尖牙相对部位。后至第一磨牙远中相对部位，作一弧形切口，分离显露舌下腺，完整的切除舌下腺及腺体四周的囊壁。术中要防止损伤颌下腺导管、舌神经、舌动脉和舌静脉。缝合伤口后应放置橡皮片引流。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)