

涎腺混合瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E6_B6_8E_E8_85_BA_E6_B7_B7_E5_c22_306424.htm 名称涎腺混合瘤所属科室口腔科临床表现腮腺混合瘤多见于中年。一般无明显自觉症状，生长缓慢，病程可达数年甚至数十年之久。肿瘤多表现为耳下区的韧实肿块，表面呈结节状，边界清楚，中等硬度，与四周组织不粘连，有移动性，无压痛。如肿瘤出现下述情况之一时，应考虑有恶变之可能。 肿瘤忽然增长迅速加快， 移动性减少甚至固定， 出现疼痛或同侧面瘫等。治疗腮腺混合瘤的治疗以手术彻底切除为原则。术前一般不宜作活检。肿瘤的包膜常不完整，有时瘤细胞可侵入包膜或包膜外组织，若切除不彻底则将复发。故手术时不宜采用剝除肿瘤的方法而应将肿瘤连同其四周的腮腺组织一并切除。术中要注重保持面神经。如有恶性变，应按恶性肿瘤的治疗原则处理。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com