

颌下间隙感染 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A2\\_8F\\_E4\\_B8\\_8B\\_E9\\_97\\_B4\\_E9\\_c22\\_306663.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E9_A2_8F_E4_B8_8B_E9_97_B4_E9_c22_306663.htm) 名称颌下间隙感染所属科室口腔科病因颌下间隙（submental space）位于舌骨上区，为颌下三角内的单一间隙。间隙内有少量脂肪组织及淋巴结，此间隙供下颌舌骨肌、颌舌骨肌与舌下间隙相隔。两侧与颌下间隙相连，感染易相互扩散。颌下间隙的感染多来自于淋巴结炎症。下唇、舌尖、口底、舌下肉阜、下颌前牙及牙周组织的淋巴回流可直接汇于颌下淋巴结，故以上区域的各种炎症、口腔粘膜溃疡、口炎等均可引起颌下淋巴结炎，然后继发颌下间隙蜂窝组织炎。临床表现由于颌下间隙感染多为淋巴结扩散引起，故一般病情进展缓慢，早期仅局限于淋巴结的肿大，临床症状不明显。当淋巴结炎症扩散至结外后，才引起间隙蜂窝组织炎，此时肿胀范围扩异展至整个颌下三角区，皮肤充血、疼痛。脓肿形成后局部皮肤紫红，扪压有凹陷性水肿及波动感染。感染向后波及颌下间隙时，可表现出相应的症状。治疗脓肿形成后，可在颌下肿胀最突出区做横行皮肤切口，分开颈阔肌达颌下间隙，建立引流。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)