

多乳症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E5_A4_9A_E4_B9_B3_E7_97_87_c22_306730.htm 名称多乳症所属科室普通

外科病因基本是由先天发育异常所致。临床表现多乳症在青春期前处于相对静止状态。随着第二性征的发育而逐渐增大，同时受内分泌激素的影响，在月经期、妊娠期和哺乳期出现局部增大、肿胀和疼痛。完全性副乳腺者，甚至可以出现乳汁的分泌。月经期、妊娠期及哺乳期后症状可随之明显减轻或消失。体格检查中，多数病例可于腋部或相当于原部位见类似乳头样突起，或为局部米粒大小的色素沉着或皮肤凹陷。部分病例可扪及肿块，有触之疼痛，边缘不清，质地柔软或较韧与深部组织无粘连，而与皮肤可有粘连。少数病例成半圆形或呈不规则状隆起。完全性副乳者在哺乳期可有乳汁分泌。副乳腺如伴有肿瘤，其症状与乳房肿瘤及体征相似。部分副乳腺可患乳腺病。检查B超、细针穿刺及钼靶摄片有助于诊断，切除病理检查可以明确诊断治疗多乳症较小而无明显症状者，可不必处理。如有下列情况，应考虑手术治疗。* 腺体逐渐增大，疼痛不适者。* 副乳腺内扪及异常肿块，疑伴发肿瘤者。* 有乳腺癌家族史者。* 多乳症明显隆起或乳头肥大、乳晕色素影响外观者。手术一般应住院进行。术中应常规作冰冻切片检查，以免误诊。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com