

后牙反合 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E5_90_8E_E7_89_99_E5_8F_8D_E5_c22_306756.htm

名称后牙反合所属科室口腔科

病因1.由于乳磨牙早失或滞留引起恒牙上后牙舌向错位或下后牙的颊向错位，可导致个别后牙反。2.一侧深龋，只能用另一侧咀嚼，日久可导致单侧多数后牙反。3.对一侧下颌的不正常压力，如长期地有一侧托腮的习惯，可使下颌逐渐偏向另一侧，也可引起另一侧多数后牙反。4.口呼吸患者两腮压力增大，上牙弓逐渐变窄，可引起双侧多数后牙反。5.腭裂患者，上牙颌弓宽度发育不足，常有双侧后牙反。

临床表现可见单侧后牙反功能、颌面部发育及颞下颌关节。

诊断1.个别后牙反对咀嚼功能及颌骨影响不大，但可能对颞下颌关节有不良影响。2.多数后牙反则对功能、颌面部发育颞下颌关节均有影响。3.单侧多数后牙反的程度愈严重，对咬合的锁结作用及对咀嚼的功能障碍也愈大，对颌骨的发育及关节的影响也愈大。4.多数后牙反其前颌骨发育不足，颜面的侧面还会呈现凹面型。5.双侧多数后牙反上牙弓及上颌骨宽度发育多受限制，上颌弓狭窄，面部表现狭长，但左右对称。

治疗1.一侧后牙反后牙。2.双侧后牙反侧使用舌簧继续矫正这一侧的上后牙向颊侧移动，以矫治反。此外，还可应用螺旋簧分裂基托矫治器。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com