

面神经炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E9_9D_A2_E7_A5_9E_E7_BB_8F_E7_c22_306893.htm 名称面神经炎所属科

室神经内科诊断一、病史及症状：青壮年多发，部分病人发病前数日有同侧耳后、耳内、乳突区痛疼。病史询问应注重发病前有无面部受凉受风吹等诱因，多数病人于晨起洗漱时忽然发现面颊动作不灵或歪斜，表情不自如，前额纹消失，眼裂开大、鼻唇沟平坦、口角下垂等。二、查体发现：1.四周性面瘫，病侧不能作皱眉、闭目、示齿、鼓腮等动作。2.茎乳突孔以上面神经受损影响到鼓索支时尚有舌前2/3味觉障碍。3.蹬骨肌分支受累可发生听觉过敏。4.膝状神经节受累，外耳道出现疱疹，称（Hunt氏综合征）。三、辅助检查：1.内听道X线片正常。2.电生理检查、面神经MCV减慢，面肌EMG动作电位波幅降低或消失。四、鉴别：应与引起急性四周性面瘫的其他疾病相鉴别，如腮腺炎或腮腺部肿瘤、桥小脑角肿瘤等。治疗一、改善微循环，减轻局部水肿，营养神经。706代血浆500ml 胞二磷胆碱500mgV D1次/d7~10天为一疗程,强的松30~40mg1次/d口服,一周后渐减量,维生素B1 30mg2次/d口服,维生素B12 100~500ug肌注1次/d。二、理疗：急性期茎乳孔四周部位给以热敷、红外线照射、超短波治疗。三、保护暴露角膜，防止结合膜炎发生，涂眼膏，戴眼罩。局部保温，按摩均有利于改善局部血液循环，减轻水肿。四、中药：牵正散（僵蚕3g、全蝎3g、白附子3g）共研末，每日服3g。五、针灸：急性期过后，如不恢复可配合针灸治疗（取穴颊车、地仓、耳门、牵正等穴）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com