

脑外伤所致精神障碍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E8\\_84\\_91\\_E5\\_A4\\_96\\_E4\\_BC\\_A4\\_E6\\_c22\\_306906.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E8_84_91_E5_A4_96_E4_BC_A4_E6_c22_306906.htm) 名称脑外伤所致精神障碍所属科室精神病科临床表现急性脑外伤患者可伴有程度不等的意识障碍，从意识模糊直到昏迷。在清醒过程中，可能出现紧张惧怕、兴奋不安、言语零乱、定向丧失和恐怖性的幻视等，称为外伤性谵妄。意识恢复后，常不能回忆起受伤前后的经过，称为外伤后遗忘。对紧接着受伤以前一段时期内的事件的遗忘称为逆行性遗忘（retrograde amnesia），在急性期后或间歇一段时期后，患者会出现头痛、头晕、对光声敏感、易疲惫、激惹性增高、注重力涣散、记忆减退、神经过敏、植物神经功能失调等症状，一般可持续数月后恢复。少数患者性格上有缺陷或夹杂有社会心理因素者，病情可迁延不愈。部分严重的脑外伤患者可逐渐发展为痴呆综合征。记忆、理解和判定能力明显减退、思维迟钝、情感淡漠、精神萎靡、缺乏主动性等。有的患者可伴有人格改变，表现为情绪不稳、易激惹、自我控制能力减退、脾气怪僻、粗暴自私和丧失进取心。人格改变多见于左侧半球的损害，非凡是累及额叶及颞叶结构的患者。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)