

疔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E7_96_96_c22_306994.htm 名称疔所属科室普通外科临床表现 最初，局部出现红、肿、痛的小结节，以后逐渐肿大，呈锥形隆起。数日后，结节中心因组织坏死而变软，出现黄白色小脓栓；红、肿、痛范围扩大。再数日后，脓栓脱落，排出脓液，炎症便逐渐消失而愈。疔一般无明显的全身症状。但若发生在血液丰富的部位，全身抵抗力减弱时，可引起不适、畏寒、发热、头痛和厌食等毒血症状。面部，非凡是所谓“的上唇四周和鼻部疔，如被挤压或挑刺，感染轻易沿内眦静脉和眼静脉进入颅内的海绵状静脉窦，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现延及眼部及其四周组织的进行性红肿和硬结，伴疼痛和压痛，并有头痛、寒战、高热甚至昏迷等，病情十分严重，死亡率很高。治疗 对炎症结节可用热敷或物理疗法（透热、红外线或超短波），亦可外敷鱼石脂软膏、红膏药或金黄膏。已有脓头时，可在其顶部点涂石炭酸。有波动时，应及早切开引流。对未成熟的疔，不应恣意挤压，以免引起感染扩散。面部疔，有全身症状的疔和疔病，应给予磺胺药或抗生素。并注重休息，补充维生素，适当增加营养。预防及预后 注重皮肤清洁，非凡是在盛夏，要勤洗澡、洗头、理发、勤换衣服、剪指甲，幼儿尤应注重。用金银花、野菊花煎汤代茶喝。疔四周皮肤应保持清洁，并用70%酒精涂抹，以防止感染扩散到四周的毛囊。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com