

***痉挛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__2A_2A_E7_97_89_E6_8C_9B_c22_307147.htm 名称***痉挛所属科室精神病科诊断CCMD-2-R有关***痉挛的诊断标准为：（1）性交时***肌肉强烈收缩，致使***插入困难或引起疼痛。（2）不是局部病变或躯体疾病引起的继发性症状。治疗本病的治疗原则应以消除心理障碍为主，了解性生活的规律，鼓励夫妻双方共同参与治疗，相互配合，主动照顾对方，纠正不良的性行为习惯，通过感情交流，学习培养建立起新的配合默契的性行为。主要手段是使用***扩张器。（1）心理治疗 把有关***痉挛的医学资料如解剖，可能的病因同时讲给患者夫妻双方，并与他们一起讨论***痉挛的受累部位。向患者夫妻双方强调指出***痉挛反射为非自主性的，消除男方误认为患者故意防碍性交的错误想法，并使其观察***非自主性缩窄的特点。（2）进行骨盆肌群的rdquo.练习 嘱患者用力绷紧骨盆肌肉，维持3~4秒钟再放松，反复进行，骨盆肌肉即相对松弛下来。（3）扩张*** 在做rdquo.练习的基础上，依次使用（从小号开始）涂有润滑剂的***扩张器，每日4次，每次10~15分钟，插入***扩张器后继续做rdquo.练习，直到能顺利插入4号扩张器，能适应4号扩张器后，可适当进行性交，一般能顺利完成。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com