

咽部结核 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_92_BD_E9_83_A8_E7_BB_93_E6_c22_307152.htm 名称咽部结核所属科室耳鼻喉科

临床表现鼻咽结核常表现粘膜溃疡或肉芽形成。

病人有鼻塞、流涕、听力减退等症状。扁桃体结核，常无明显症状，称为隐性结核，伴有颈部结核性淋巴结炎。咽结核

一般分为急性粟粒型和慢性溃疡型两类。1.急性粟粒型咽结核

常继发于活动性开放性肺结核或粟粒性肺结核。为全身免疫力不良的表现，也是严重肺结核的一种恶性并发症。病人

体温高，全身情况极差，咽痛剧烈，吞咽尤甚，常放射至耳部。病初起时，在粘膜下出现多数粟粒状小结节，迅速溃烂

形成边缘不整洁的溃疡，上覆灰黄色污秽分泌物。好发于软腭、咽后壁和咽侧壁。也可以发生于扁桃体及其他部位并常

向口腔及喉部蔓延。2.慢性溃疡型咽结核发展较慢，除吞咽痛外，其他症状不甚明显。好发于咽腭弓及咽后壁，在苍白

水肿的粘膜上有局限性浸润病变。继而溃破形成浅表溃疡，溃疡可局限于一处或数处，边缘不整洁，呈鼠咬状，其上覆

有灰黄色假膜。若有继发感染，溃疡发生死而深陷，形成潜行性边缘。诊断活检可确诊。根据病史、临床表现及有关化

验检查，可以找出原发病灶。治疗全身抗痨治疗最为重要。局部治疗主要在于减轻疼痛及吞咽困难。如饭前可用0.5%

~1%的卡因喷雾咽部，以暂缓疼痛。对慢性溃疡型而病变范围不方法者，可用50%~80%乳酸、20%硝酸银或钝铬酸烧灼

，促使溃疡愈合。局部用1%链霉素漱口或喷咽。饮食不宜过热或过冷，宜与体温相当。此外，尚需注重增加营养和维持

口腔清洁。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com