

露阴癖 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E9_9C_B2_E9_98_B4_E7_99_96_c22_307158.htm 名称露阴癖所属科室精神病科临床表现这类患者的共同特点是在异性面前裸露自己的生殖器而得到性的满足。在暴露之前往往先有渐增的焦虑紧张感，露阴地点及露阴时间多在黄昏或尚有行人的晚上，选择自己轻易逃跑的地方，或者比较僻静的角落，如街头巷尾、影院或公园，当生疏异性走近时，忽然露出生殖器，经常为勃起的***，使对方惊惶失措或耻笑辱骂而感到性的满足，有的同时伴有手淫，但并不对异性发生其他不轨行为。此种行为常呈周期性或间歇性发生。诊断CCMD-2-R有关露阴癖的诊断标准为：符合性变态的诊断标准；在半年以上的时间内，反复出现向生疏异性露出生殖器的强烈欲望和性兴奋的联想；曾经付诸行动。鉴别诊断诊断本症需与颞叶癫痫自动症相鉴别。露阴癖是预谋作案，而颞叶癫痫多忽然发作；露阴癖多在僻静处路口或黑暗处发生，以利逃走；而颞叶癫痫往往在众人之前发作，而且露阴时呆滞不动，甚易被抓获；露阴癖暴露对象为生疏人，癫痫发作时不分场合，可当妻女或邻人裸露；颞叶癫痫往往有大发作或不典型发作史，深部电极非凡是蝶骨电极可引起异常脑波，抗癫痫药物治疗有效；露阴癖作案过程意识清楚，颞叶癫痫患者事后不能回忆。治疗Witzig（1970）曾专心理治疗，效果不佳。电击厌恶疗法据称有些作用，但总的说来，疗效并不理想。严格要求，加强监护可减少露阴行为的次数。预防及预后有的在首犯后慑于法纪，往往能完全改过，但多次发生者，往往难以纠正。儿童发生露阴行为者预后不良。复发露阴

行为者，如有良好的异性恋适应，往往预后良好。既往有其他犯罪行为者预后不良。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com