

异性装扮癖 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_BC_82_E6_80_A7_E8_A3_85_E6_c22_307230.htm 名称异性装扮癖所属科室精神病科临床表现一般从青春期开始异装，一开始只穿异性的一、二件衣服，以后逐渐增多，直至全身内外均是异性服饰。在这时往往产生***勃起，并予手淫。着异装一般不在公共场合，常是在自己的房间，他有一套至多套异性服装，有时公开穿着最时髦的服装，安装假发或烫发或应用化妆品。它们天天穿着异装时间不定，但往往开始时是间发，后来越加频繁，有的穿着入睡。有的着异装同时手淫或性交以得到性的满足。家人对其着异装的态度是不一致的，多数出于无奈任其妆扮，有的采取宽恕和同情的态度并协助其穿异性服装。诊断CCMD-2-R有关异性装扮癖的诊断标准为：
符合性变态的诊断标准； 成年人穿着异性服装，不是由于非凡文化背景与社会流行风尚所致，纯属个体非凡行为，主要是为获得性的兴奋； 反复出现此种行为半年以上，行为受到强烈欲望所驱使，行为的抑制可引起明显不安情绪；
除异性装扮外，不要求改变自身性别解剖生理特征，否则诊断为性别变换癖。同性恋者异性装扮的目的是吸引同性对象，其异性装扮本身不引起性兴奋者，亦不属此诊断。鉴别诊断易性癖：异性装扮癖者对异装的具体细节均感到称心，而易性癖者对异装并不十分关注。异装癖着异装的时间较易性癖长。异装癖自儿童早年开始，而易性癖多在年长性别意识巩固建立后才出现。异装癖着异装有象征或引起性激动，而易性癖着异装纯系基于对其女性性别的喜爱。颞叶癫痫：颞叶癫痫患者可有异装癖表现，但尚有癫痫其他表现及EEG异

常。治疗Rosen（1979）报道心理分析治疗，Marks与Gelder（1967）报道厌恶疗法，治疗应根据不同情况进行，异性恋性异装癖者通过反复精神治疗增强其克制能力，同性恋者可参照同性恋章节。预防及预后大多数异装癖持续多年，随中年后性欲减退而减轻。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com