

咽部狼疮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_92_BD_E9_83_A8_E7_8B_BC_E7_c22_307247.htm 名称咽部狼疮所属科

室耳鼻喉科临床表现病程进展极慢，病人常不知何时起病。

一般症状稍微，常感咽部不适及粘着感，吞咽稍有不便，通常无咽痛，全身情况较好。悬雍垂常为首发部位，继而侵及舌腭弓及软腭，但扁桃体极少受侵犯。按临床经过可分四期。

1.粘膜下浸润期 粘膜苍白、肿胀、微干而有光泽，失去柔软性。2.结节增生期 狼疮结节色淡红或淡黄，大如小米，多数结节聚集成颗粒状的狼疮病病灶，病灶上的结节有时因粘膜充血不易辨认，涂以肾上腺素液、结节常可显示出典型的苹果酱色。3.溃疡期 结节溃烂而成溃疡，表面可有白色假膜覆盖，溃疡一般较浅，边缘凸起含有结节，底部常有肉芽。

4.瘢痕形成期 溃疡常可自愈而形成光滑的瘢痕，悬雍垂可因软腭收缩而缩短。诊断咽狼疮与其他部位的狼疮相同，以隐袭起病和无痛发展为其特点。当面部或鼻部发生狼疮，而咽部又有典型的苹果酱样结节发生时，诊断轻易，但仍需通过

活检方可确诊。本病需与咽结核及三期梅毒相鉴别。治疗以全身治疗为主，常用药物有链霉素、异烟肼、利福平、对氨基水杨酸等。改善营养，给予各种维生素及钙剂。注重口腔卫生，保持局部清洁并及时用药，只要经过适当治疗，预后良好。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com