

更年期精神病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E6_9B_B4_E5_B9_B4_E6_9C_9F_E7_c22_307367.htm 名称更年期精神病所属科室精神病科诊断1.更年期首次发病，既往无类似发作。2.临床表现 更年期综合征：以植物神经功能失调与情绪障碍为主要特征，表现有阵发性潮热、多汗、焦躁、忧虑、惧怕、易激惹或神经衰弱综合征，性功能障碍。伴有肢体麻木、浮肿、乳房胀、腰酸、腹痛等躯体不适。 更年期忧郁症：早期多有更年期综合征表现。临床表现以情感低落、思维迟钝为主，重者可有自卑、自责、自罪及自杀企图或行为。常伴有明显的焦虑不安或急性焦虑发作。 更年期偏执状态：以嫉妒、疑病、被窃或被害等妄想为常见，可伴有幻觉。幻觉与妄想内容较固定，并影响患者的情绪与行为，而致紧张、焦虑、惧怕、愤怒、冲动、拒食或自伤等。但从不影响患者与环境接触及操持家务，常主动倾述内心体验。3.起病较缓，病程较长并有病情波动与反复，但智能良好，人格完整。4.排除躁郁症的抑郁发作、精神分裂症、反应性精神病及脑器质性疾病。治疗1.精神支持、生物反馈或松弛治疗。2.药物治疗 更年期综合征给予苯二氮卓类抗焦虑药，心得安10~20mg3次/日，谷维素10~20mg3次/日。女性患者口服己烯雌酚0.5mg/日或舌下含化己烯雌酚0.25~0.5mg与甲基睾丸酮5mg1次/日，20天为一疗程。男性患者口服甲基睾丸酮5mg2次/日或肌注丙酸睾丸酮25mg2次/周。 更年期忧郁症的治疗以抗焦虑药与抗抑郁药为主，并用更年期综合征的治疗。 更年期偏执状态的治疗同精神分裂症，但药物剂量不宜过大，加减剂量的速度应缓慢。3.针灸、理疗适用于更年

期综合征。胰岛素低血糖治疗对更年期忧郁症疗效较好，自杀企图严重者可用电休克治疗。加强监护，严防伤人、自伤或自杀，预防并发症。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com