

肺毛霉菌病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E8_82_BA_E6_AF_9B_E9_9C_89_E8_c22_307582.htm 名称肺毛霉菌病所属
科室呼吸内科病因 毛霉菌可存在于正常人口腔和鼻咽部，一般情况下不致病。机体免疫功能降低时可侵入支气管和肺，产生急性炎症，并经血行累及脑和全身各脏器，也可通过吸入孢子而致病。原发性感染罕见。病理特征是血管梗塞和组织坏死。肺呈实变，弹性差；切面显示大片出血伴新近的梗塞。镜下见不同程度的水肿、充血、大片出血、坏死，伴中性粒细胞和浆细胞浸润，有时见到巨噬细胞；组织常呈化脓性变化，很少形成肉芽肿。本菌对血管具有非凡的亲合力，但很少侵入静脉，大多直接侵犯大、小动脉，导致血栓形成，邻近组织梗塞、缺血和坏死。在血管壁内可见到10~20quot.毛霉菌球quot.毛霉菌球".可作肺叶切除。并于术前、术后给予两性霉素B治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com