

恐缩症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E6_81_90_E7_BC_A9_E7_97_87_c22_307631.htm 名称恐缩症所属科室精神病科

诊断一、发病特点：有易感人群，好发于智力较差与超我力较低，暗示性高、敏感、焦虑和神经质的人群，病前有一定的民间迷信信念（鬼、神作祟等），并有一定的引发事件，促使易感者发病。二、主要症状：（1）精神症状，恐怖性焦虑，严重者可达惊恐发作程度。发作时自感生殖器官（**、乳房、阴门）缩入体内，烦躁不安有濒死感，每次发作数分钟至十分钟方能缓解。也可表现为感知障碍，感觉生殖器官收缩，疼痛，身体其它器官有麻木感，有幻觉，如听到鬼叫、进门声，幻觉具有心因性，部分有意识障碍--意识模糊，事后不能回忆。（2）植物神经症状：可有心慌、气促、面色苍白、出汗、血压升高，尿急、眩晕等。三、体检发现：有的可见生殖器官由于发作时双腿用力夹紧生殖器导致损伤性溃烂。四、鉴别诊断：本症与脑器质性疾病，精神分裂症所出现的继发性缩阳症相鉴别。治疗 发病时不要围观，保持肃静，应进行积极的心理治疗，向病人讲明本症的实质，解除惧怕感，兴奋不安时可选用适量的焦虑药物，破除迷信，提高人群文化素质和心理承受力可预防本症的发生。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com