

反应性精神病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_8F_8D_E5_BA_94_E6_80_A7_E7_c22_307656.htm 名称反应性精神病所属科室精神病科

诊断一、有明确、持久而强烈的精神创伤病史，急性或亚急性起病，约半数病人在精神创伤后1~2天之内出现症状，也有长达1~2个月或数月后发病。

二、症状特点：本病有急性反应性精神病与持续性反应性精神病两种类型：**急性反应性精神病**在忽然和剧烈精神刺激后24小时之内发病，表现为反应性意识模糊状态；反应性兴奋；反应性木僵。**持续性反应性精神病**多由长期持续的精神因素所引起，病程经过较长，主要为反应抑郁症；反应性偏执状态等。

三、鉴别诊断：需与抑郁症、更年期忧郁症，神经症性抑郁、精神分裂症偏执型，更年期偏执状态，癔病，症状性精神病相鉴别。治疗本病以精神治疗为主，配合环境治疗及必要的精神药物，并应针对不同临床表现采取相应的综合治疗措施。参见延迟性应激障碍一节。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com