

胃息肉 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E8_83_83_E6_81_AF_E8_82_89_c22_307662.htm 名称胃息肉所属科室消化内科临床表现 早期可无明显症状。约半数患者在胃肠钡餐造影、胃镜检查或因其它原因而手术时意外发现。症状以上腹部不适与隐痛最为常见。偶有恶心和呕吐。带蒂的幽门部息肉脱垂可产生餐后中上腹痉挛性疼痛或暂时性幽门梗阻。贲门部息肉可向食管脱垂引起暂时性吞咽困难。息肉可因溃疡而出血。检查 本病可无阳性体征。伴出血者可有缺铁性贫血表现。X线钡餐检查可显示充盈缺损。气钡双重低张造影可发现 ≤ 1 cm的息肉。胃镜检查可见圆形或卵圆形隆起，良性息肉常 < 2 cm，外形规整，表面光滑，色泽暗红。多数带蒂。恶性息肉常 > 2 cm，外形不规则，表面不平或有糜烂出血，多数无蒂。直视下活检及组织学检查有助于鉴别。治疗 带蒂的息肉可经胃镜摘除，无蒂者尤其直径 > 2 cm者一般主张手术切除。如无症状的老年患者或者有夹杂症不能耐受手术者，应定期随访。如不伴发胃癌，息肉摘除或切除后，一般预后良好。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com