

多种抽动综合征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/307/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_9A\\_E7\\_A7\\_8D\\_E6\\_8A\\_BD\\_E5\\_c22\\_307745.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E5_A4_9A_E7_A7_8D_E6_8A_BD_E5_c22_307745.htm) 名称多种抽动综合征所属科室精神病科诊断一、起病于儿童，多在5~15岁之间。二、症状特点：多部位，不自主的、突发性肌肉抽动，伴有爆发性发声和污秽语句，并有强迫意向和个性改变。首先从头面部肌肉抽动开始，逐渐发展至躯干部的抽动。发作时间一日少者十多次甚至达数百次。抽动毫无目的性。大部分数月数年后出现爆发性异常喉声。症状多在睡眠时消失，智力发育正常。三、辅助检查：脑电图、IQ正常，神经系统检查无阳性体征。四、鉴别诊断：需排除舞蹈症、瘧病、癲癇。治疗药物治疗首选氟哌啶醇，起始0.5~1mg，2次/d尔后逐渐加量，每日治疗量2~8mg，用药1~2周后症状改善。为防止锥体外系副反应，可加用安坦2mg/日。其次泰必利也可用于本症的治疗，从小剂量开始，以后逐渐加量，治疗量为0.13次/d。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)