

蛲虫病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E8_9B_B2_E8_99_AB_E7_97_85_c22_307886.htm 名称蛲虫病所属科室消化内科临床表现一般症状稍微，主要表现是夜间***及阴部奇痒，因而失眠，烦躁不安，夜惊等。由于蛲虫可钻入粘膜深层引起轻度炎症。亦可出现消化不良、恶心、呕吐、腹痛、食欲减退等症状。偶有蛲虫侵入泌尿系统或女性生殖系统，引起尿频、***炎、输卵管炎或腹膜炎诊断对夜间有***及阴部奇痒者，应于夜间检查***部有无白色线头状蛲虫，如能检得蛲虫则可确诊。粪常规检查虫卵阳性率低，必须于清晨大便前，用透明胶纸轻轻擦***后再查虫卵。治疗一、驱虫治疗（一）本咪唑类化合物均有疗效。如丙硫苯咪唑即肠虫清400mg - 剂疗法，治愈率几乎达100%，但蛲虫病轻易自身重复感染，故在治疗后2 - 4周，应再重复治疗1次。（二）苯酚宁pyrvinium（商品名扑蛲灵）儿童每公斤5mg，成人总剂量不超过250mg，睡前顿服（药片不可咬碎），为了防止复发，间隔14日后再服一剂，疗效佳，副作用少，偶有恶心、呕吐反应。（三）噻乙吡啶成人剂量为250mg，儿童剂量按5mg/kg，半空腹1次顿服，有显著驱蛲效果。二、一般治疗每晚睡前洗净***四周皮肤后，用10%氧化锌软膏、2%白降汞软膏、10%鹤风油膏或蛲虫药膏（含百部浸膏30%，龙胆紫0.2%等）涂布肛四周皮肤上，有杀虫、止痒作用。蛲虫在人体内寿命一般不超过2月，若能避免重复感染，则不用药物治疗亦可自愈，药物治疗即使效果比较满足。但疗效不能巩固，这与自身再感染有关，故必须结合预防，若能每日换洗衬裤及床单则可不治自愈。预防及预后加强卫生宣传教育，

养成良好卫生习惯，饭前便后洗手，不吸吮手指，睡前清晨应清洗***，组织进行集体性诊治等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com