

耵聍栓塞 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/307/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_B5\\_E8\\_81\\_8D\\_E6\\_A0\\_93\\_E5\\_c22\\_307970.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E8_80_B5_E8_81_8D_E6_A0_93_E5_c22_307970.htm) 名称耵聍栓塞所属科室耳鼻喉科病因耵聍腺分泌过多或排出受阻，如外耳道狭窄、异物存留，骨疣等。临床表现可出现听力减退、耳鸣、耳痛，甚至眩晕。遇水后耵聍膨胀，完全阻塞外耳道，使听力减退。还可刺激外耳道引起外耳道炎。若压迫刺激鼓膜，可致耳鸣，偶有因压迫中耳引起眩晕者。检查可见棕黑色或黄褐色块状物堵塞外耳道内。治疗用耳镊或耵聍钩取出耵聍团块。若大而硬难以取出者，先滴入5%碳酸氢钠或1~3%酚甘油，每日滴4~6次，待软化后可用上述器械取出或用冲洗法清除。已有外耳道炎者，应先控制炎症，再取耵聍。外耳道冲洗法：病人或助手手扶弯盘放于耳垂下，拉直外耳道，用20~50毫升注射器接钝粗针头或用特制外耳道冲洗器，吸温冲洗液，将冲洗器头放入外耳道内靠近后上壁，逐渐轻轻加压冲洗，使水流冲向外耳道后上壁，冲洗液进入深部并借回流力量将耵聍冲出（图8-1）。冲洗完后用干棉签拭净外耳道。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)