

结肠易激综合征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_BB_93_E8_82_A0_E6_98_93_E6_c22_308179.htm 名称结肠易激综合征
所属科室消化内科临床表现临床上女性多见，主要表现为突发性或阵发性左下腹痉挛性疼痛，伴排便异常（粪便呈粪状，可为粘液增多）多于进食生冷饮食后诱发或加重，排气、排便或腹部热敷后腹痛可以缓解的特点。腹泻除含有粘液外，无其他有形成分，可发生在餐后、晨间或傍晚，但绝不发生在夜间。有些患者可有腹泻、便秘交替现象。诊断X线造影示结肠在痉挛变细，钡剂通过增速、结肠袋加深。在除外了器质性病变，如细菌性痢疾、阿米巴痢疾、炎症性肠病、结肠癌等等，方可诊断本征。治疗治疗上应向患者作耐心细致的解释工作，调整胃肠道功能失调，保持大便通畅。用安定、谷维素等镇静和调节植物神经类药物。腹泻可选用苯乙哌啶或易蒙停。便秘者应以润肠为主，可用当归30g或/和火麻仁30g，水煎服；或用通泰胶囊，每次2~4粒，每日3次。痉挛性腹痛可选用硝苯吡啶或普鲁本辛，并建立正常的肠道菌群。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com