

绒毛膜促性腺激素综合征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_BB_92_E6_AF_9B_E8_86_9C_E4_c22_308268.htm 名称绒毛膜促性腺激素综合征所属科室内分泌科病因 绒毛膜促性腺激素（hCG）是含有2个**链（beta.）的糖蛋白，其alpha.链相似，其beta.链相同，但其羧基端则另有一个30个氨基酸的片段，其活性取决于alpha.、alpha.、alpha.链或beta.链，一例胃类癌产生alpha.链升高见于1 / 3肺癌患者，1/5胃癌患者，1 / 5的结肠癌女病人。Kahn等（1977）报告60%胰岛细胞癌hCG增加，但良性胰岛细胞肿瘤则不增加。临床表现可分两类： 性早熟：因为hCG作用类似LH而无FSH作用，故不发生女孩同性性早熟，主要是男孩同性性早熟，可见于肝母细胞瘤与松果体或性腺畸胎瘤。除第二性征发育尚可见杵状指及骨骼成长提前等。血睾酮高达成人水平。 男性乳房发育，有疼痛而无溢乳。多见于中年男性肺癌病人，其次见于胃癌、肾癌等。在成年女性患者一般并无症状，有时可有闭经或月经过多，血、尿中雌激素增高。患者血、尿中hCG增高（RIA或RRA测定），且不被性激素所抑制，女性患者须除外月经中期或更年期后之LH生理性增高。治疗主要是切除肿瘤或局部放射，对化疗不敏感。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com