

复方阿莫西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E6\\_96\\_B9\\_E9\\_98\\_BF\\_E8\\_c22\\_308297.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_8D_E6_96_B9_E9_98_BF_E8_c22_308297.htm) 药品名称复方阿莫西林  
药物别名奥格门汀，安美汀，阿莫西林-克拉维酸钾、力百汀、安奇、安灭菌 Augmentin 英文名称Amoxicillin Clavulanic Acid 类别抗痛风药说明片剂：0.375g，0.75g；粉针剂：1.2g(含阿莫西林1g，克拉维酸钾0.2g)(或阿莫西林 500 mg，克拉维酸100 mg)；糖浆剂：阿莫西林 amoxicillin 125 mg，克拉维酸(钾盐) clavulanate potassium 31.25 mg。用法用量空腹口服：按制剂总量计，成人及体重40kg以上儿童，0.375g~0.75g/次，3次/日。儿童(40kg以下)每日20mg~40mg/kg，3次/日。静注或静滴成人及体重40kg以上儿童，1.2g/次，3~4次/日。儿童(40kg以下)每次20mg~30mg/kg，3~4次/日。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。血液透析可降低血药浓度。用前需做青霉素钠的皮内敏感试验，阳性反应者禁用。溶解后的奥格门汀应立即给药，任何剩余药液应废弃不可再用。制备好的奥格门汀溶液不应冷冻保存。本品不宜肌肉注射。孕妇不宜使用。严重肝功能障碍患者慎用本品。中度或重度肾功能障碍的病人应用本品应按医嘱调整剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)