

哌拉西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_93\\_8C\\_E6\\_8B\\_89\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308304.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_93_8C_E6_8B_89_E8_A5_BF_E6_c22_308304.htm) 药品名称哌拉西林钠  
药物别名哌拉西林钠 英文名称Piperacillin Sodium 类别抗痛风  
药说明注射用哌拉西林钠：每瓶0.5g；1.0g（效价）。用法用量  
尿路感染，1次1g，1日4次，肌注或静注。其他部位（呼吸道、  
腹腔、胆道等）感染：1日4～12g，分3～4次静注或静滴。  
严重感染可用10～24g/日。注重事项（1）以上几种青霉素都可  
导致过敏反应，用前要按规定方法（见前）进行应试。苄星青霉  
素因使用间隔期长，所以在每次用药前都要进行皮试。对普鲁卡  
因过敏者禁用普鲁卡因青霉素。（2）普鲁卡因青霉素偶可致一  
种特异反应。注射药物当时或之后1～2分钟内，患者自觉有心里  
难受、濒危惧怕感、头晕、心悸、幻听、幻视等症状。一般无呼  
吸障碍和循环障碍，多数病例可出现血压升高（可与过敏性休克  
相鉴别）。一般不需非凡处理，症状维持1～2小时可自行恢复正  
常。用镇静药（安定）或抗组胺药（肌注苯海拉明20mg）有助  
于恢复。（3）低剂量的青霉素不引起毒性反应。大剂量应用，  
可出现神经-精神症状，如反射亢进、知觉障碍、幻觉、抽搐、昏  
睡等，也可致短暂的精神失常，停药或降低剂量可恢复。对于少  
数有血凝功能缺陷的患者，大剂量青霉素可扰乱血凝机制，而致  
出血倾向。（4）不宜鞘内给药。100Test 下载频道开通，各  
类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)