

氟氯西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_9F_

[E6_B0_AF_E8_A5_BF_E6_c22_308317.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_9F_E6_B0_AF_E8_A5_BF_E6_c22_308317.htm) 药品名称氟氯西林

英文名称Flucloxacillin 类别抗痛风药说明片剂（游离酸）：每

片125mg。注射用氟氯西林钠：每瓶500mg；1000mg。用法用

量口服（用游离酸）：常用量为每次250mg，每日3次；重症

用量为每次500mg，每日4次，于食前0.5～1小时空腹服用。

肌注：常用量每次250mg，每日3次；重症每次500mg，每日4

次。静注：每次500mg，每日4次，将药物溶于10～20ml注射

用水或葡萄糖输液中推注，每4～6小时1次。1日量不超过8g

。儿童：2岁以下按成人量的1/4～10岁按成人量的1/2，

根据体重适当调正。也可按照每日25～50mg/kg，分次给予

。注重事项1 对青霉素过敏者禁用。2 注射时勿与血液、血浆

、水解蛋白、氨基酸以及脂肪乳配伍。3 本品可使氨基糖苷

类降效，不可配伍。4 可出现胃肠道反应，如恶心、呕吐、

腹胀、腹泻、食欲不振等，口服给药时较常见。其他尚有静

脉炎。大剂量应用可出现神经系统反应，如抽搐、痉挛、神

志不清、头痛等。偶见中性粒细胞减少，对特异体质者可致

出血倾向。个别人氨基转移酶升高。5 尚可见药疹、药物热

等过敏反应。少数人可发生白色念珠菌继发感染。100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com