

氯唑西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_B0_AF_E5_94_91_E8_A5_BF_E6_c22_308321.htm 药品名称氯唑西林钠
药物别名邻氯青霉素钠 英文名称Cloxacillin Sodium 类别抗痛风药
说明注射用氯唑西林钠：每瓶0.5g（效价）。胶囊剂：每胶囊0.125g；0.25g；0.5g。颗粒剂：50mg。用法用量（1）肌肉注射：1次0.5～1g，1日3～4次。（2）静滴：1次1～2g，溶于100ml输液中，滴注1/2～1小时，1日3～4次。小儿每日用量30～50mg/kg，分次给予。口服剂量相同。注重事项（1）本品可致过敏性休克，用药前应作过敏试验。（2）可出现胃肠道反应，如恶心、呕吐、腹胀、腹泻、食欲不振等，口服给药时较常见。其他尚有静脉炎。大剂量应用可出现神经系统反应，如抽搐、痉挛、神志不清、头痛等。偶见中性粒细胞减少，对特异体质者可致出血倾向。个别人氨基转移酶升高。（3）尚可见药疹、药物热等过敏反应。少数人可发生白色念珠菌继发感染。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com