

苯唑西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8B\\_AF\\_E5\\_94\\_91\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308325.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E8_8B_AF_E5_94_91_E8_A5_BF_E6_c22_308325.htm) 药品名称苯唑西林钠

药物别名苯唑青霉素钠，新青霉素 英文名称Oxacillin

Sodium 类别抗痛风药说明注射用苯唑西林钠：每瓶0.5g；1g

（效价）。用法用量（1）口服：1次0.5～1g，1日4次，宜空腹时服。

（2）静滴：1次1～2g，必要时可用到3g，溶于100ml输液内滴注1/2～1小时，1日3～4次。小儿每日用量50～100mg/kg，分次给予。

（3）肌注：1次1g，1日3～4次。口服、肌注均较少用。肾功能轻中度不足者可按正常用量，重度不足者应适当减量。注重事项（1）本品可致过敏性休克，用药前应作过敏试验。（2）可出现胃肠道反应，如恶心、呕吐、腹胀、腹泻、食欲不振等，口服给药时较常见。其他尚有静脉炎。大剂量应用可出现神经系统反应，如抽搐、痉挛、神志不清、头痛等。偶见中性粒细胞减少，对特异体质者可致出血倾向。个别人氨基转移酶升高。（3）尚可见药疹、药物热等过敏反应。少数人可发生白色念珠菌继发感染。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)