

青霉素 V PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E9_9D_92_E9_9C_89_E7_B4_A0__c22_308329.htm 药品名称青霉素 V 英文名称Phenoxymethylpenicillin 类别抗痛风药说明常用其片剂，每片125mg（20万单位）；250mg（40万单位）；500mg（80万单位）。还有口服液或口服悬液。用法用量口服。成人剂量为125~500mg（20万~80万单位）/次，每6~8小时1次。儿童剂量：每4小时1次，每次2.5~9.3mg（4167~15000单位）/kg；每6小时1次，每次3.75~14mg（6250~22500单位）/kg；每8小时1次，每次5~18.7mg（8333~30000单位）/kg。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。不宜作鞘内注射。破伤风和白喉患者，可采用本品杀灭病原菌，阻止产生毒素，但不能代替抗毒素治疗。青霉素钾盐不可静脉推注。青霉素效价单位以结晶青霉素钠为标准，每1单位(U)相当于0.6 mg。具体见下：有青霉素类药物过敏史或青霉素皮肤试验阳性患者禁用。1. 应用本品前需具体询问药物过敏史并进行青霉素皮肤试验，皮试液为每1ml含500单位青霉素，皮内注射0.05~0.1ml，经20分钟后，观察皮试结果，呈阳性反应者禁用。必须使用者脱敏后应用，应随时作好过敏反应的急救预备。2. 对一种青霉素过敏者可能对其他青霉素类药物、青霉胺过敏，有哮喘、湿疹、枯草热、荨麻疹等过敏性疾病患者应慎用本品。3. 青霉素水溶液在室温不稳定，20单位/ml青霉素溶液30 放置24小时效价下降56%，青霉烯酸含量增加200倍，因此应用本品须新鲜配制。4. 大剂量使用本品时应定期检测电解质；5. 对诊断的干扰：(1)应用青霉素期间，以硫酸铜法测定尿糖时可能出现假阳性，而用葡萄糖酶法则不受

影响。(2)静脉滴注本品可出现血钠测定值增高。(3)本品可使血清丙氨酸氨基转移酶或门冬氨酸氨基转移酶升高。#093. 动物生殖试验未发现本品引起胎儿损害。但尚未在孕妇进行严格对照试验以除外这类药物对胎儿的不良影响，所以孕妇应仅在确有必要时使用本品。少量本品从乳汁中分泌，哺乳期妇女用药时宜暂停哺乳。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com