

阿洛西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E9_98_BF_E6_B4_9B_E8_A5_BF_E6_c22_308361.htm 药品名称阿洛西林药物别名咪氨苄西林、唑酮氨苄青霉素、苯咪唑青霉素、氧咪苄青霉素、阿尔欣 Azlin，Securopen、Azlocillinum 英文名称Azlocillin 类别抗痛风药说明粉针剂：0.5、1、2g。用法用量一般2g/次，1次/8小时，肌注、静注或静滴。重症5g/次，1次/8小时。小于7日的新生儿每次100mg/kg，2次/日；肾功能不全时剂量：肌酐清除率大于30mL/min的病人，剂量不须调整。肌酐清除率为10-30mL/min的严重感染病人，推荐用静脉给药2g，每8小时1次。肌酐清除率低于10mL/min的病人，推荐用静脉给药3g，每12小时1次。肝功能不全时剂量：阿洛西林部分在肝脏中代谢，肝功能受损患者的阿洛西林胆汁排泄量显著减少，然而没有关于肝功能不全时推荐用量的具体资料。在严重肝脏疾病时，应考虑减小剂量。婴儿每次100mg/kg，3次/日；儿童每次75mg/kg，3次/日。注重事项1.交叉过敏 阿洛西林与青霉素类药有交叉过敏。2.禁用 对阿洛西林或其它青霉素类抗生素过敏者禁用。3.慎用 (1)孕妇、哺乳期妇女慎用。(2)肾功能严重损害者慎用。(3)哮喘、湿疹、枯草热、荨麻疹等过敏性疾病史者慎用。(4)年老、体弱者慎用。4.其它注重事项 药物对检验值或诊断的影响：(1)用药期间，以硫酸铜法进行尿糖测定时可出现假阳性，用葡萄糖酶法测定则不受影响。(2)在用磺基水杨酸沸腾试验、醋酸试验、双缩脲反应、硝酸试验等方法测定尿蛋白时，可出现尿蛋白反应假阳性。用药前后及用药时应当检查或监测的项目：(1)长期用药时应常规监测肝、肾功能及血象。(2)长期用

药时应监测出、凝血时间。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com