

紫外线伤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_B4_AB_E5_A4_96_E7_BA_BF_E4_c22_308367.htm 名称紫外线伤所属科

室眼科病因电光性眼炎（photophthalmia）又称紫外线性眼炎，占眼外伤的2%。多见于金属电焊工或水银灯下电影工作者，以及紫外线灯、原子弹爆炸等。可因直接照射或间接照射所致。当一天内照射量积累到15分钟以上，6~10小时后即可出现症状。伤员每在白天工作深夜发病。24小时后无蓄积作用。临床表现初为双眼刺激及异物感，逐渐加策，眼睑痉挛、剧痛、畏光流泪，侧有暗点、红视或黄视症状发生。体征：重者颜面及眼睑皮肤潮红，结膜充血，角膜荧光素染色可见弥漫性点状差色，角膜知觉减退，瞳孔痉挛性缩小。一般2~3天后症状消失。治疗治疗方法：主要为症治疗。1、0.5%~1%的卡因液点眼，或其他表面麻醉剂滴眼或结膜下注射。2、如上法处理后，涂抗生素眼膏，包扎双眼，服镇静剂及安眠药。一般安睡数小时后症状消失或减轻，然后戴有色眼镜。3、重症病人 数小时后症状又出现，可再按上法处理一次。少数重症病人有虹膜炎症表现，可滴托品酰胺，必要时滴阿托品。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com