

美西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_BE_8E_E8_A5_BF_E6_9E_97_c22_308376.htm 药品名称美西林 药物别名氮唑青霉素，Amdinocillin，COACTIN 英文名称Mecillinam 类别抗痛风药 说明注射用美西林：每瓶0.5g；1g。用法用量静注或肌注，严重病例1日按60mg/kg，分为4~6次给予。如与其他β-内酰胺类抗生素联合应用，则按1日40mg/kg，分为4次给予，直到症状消失后2日，一般疗程为7~10天。对于复合感染，则常需延长疗程。肌注时，每0.5g本品加灭菌注射用水或0.9%氯化钠注射液2.2ml，使成约200mg/ml浓度的药液，作深部肌注。静滴时，每0.5或1g本品，稀释到50ml，使成10或20mg/ml药液，缓缓滴入或加到莫非滴管中。注重事项（1）本品偶可致过敏性休克和其他过敏反应，用前应做青霉素皮试。（2）其他不良反应有嗜酸细胞增多，血小板增多、尚有氨基转移酶值升高、碱性磷酸酶值升高、腹泻、恶心、眩晕、贫血、中性细胞减少、白细胞减少以及注射局部刺激症状等。（3）肾功能不全者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com