

羧苄西林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_BE_A7_E8_8B_84_E8_A5_BF_E6_c22_308415.htm 药品名称羧苄西林钠
药物别名羧苄青霉素，卡比西林钠 Carbecin 英文名

称Carbenicillin Disodium 类别抗痛风药说明粉针剂：0.5g，1g，2g，5g。本品为白色结晶性粉末。用法用量本品可供静脉滴注和静脉注射。肌肉注射：成人2g～8g/日，3～4次/日；儿童每日0.05g～0.2g/kg，3～4次/日。静脉注射：成人5g～20g/日，3～4次/日；儿童每日0.1g～0.4g/kg，3～4次/日。亦可作胸腔或关节腔内注射。中度感染，成人一日8g，分2～3次肌注或静脉注射，儿童每6小时按体重12.5～50mg/kg注射；严重感染，成人一日10～30g，分2～4次静脉滴注或注射，儿童每日按体重100～300mg/Kg，分4～6次注射。新生儿体重低于2kg者，首剂按体重100mg/Kg，出生第1周每12小时75mg/kg，静脉滴注；出生第2周起100mg/kg，每6小时1次。新生儿体重2kg以上者出生后第1周每8小时75mg/kg，静脉滴注，以后每6小时75mg/kg。严重肾功能不全者，每8～12小时静脉给药2g即可维持血药浓度在100mg/L水平；如同时伴肝功能损害，一日2g即可。注重事项妊娠B类。过敏者禁用。有青霉素类药物过敏史或青霉素皮肤试验阳性患者禁用。1．本品含钠量较高，故限制钠盐摄入的患者应慎用本品。2．使用本品前需具体询问药物过敏史并进行青霉素皮肤试验，呈阳性反应者禁用。3．对一种青霉素过敏者可能对其他青霉素类药物、青霉胺过敏，有青霉素过敏性休克史者约5%～7%可能存在对头孢菌素类药物交叉过敏。4．肾功能不全患者应用本品可导致出血，应注重随访凝血时间、凝血酶原时间，发

生出血时应及时停药并予适当治疗。5. 由于浓度较高的羧苄西林钠溶液可形成多聚体(为致敏区), 因此注射液皆须新鲜配制。100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com