

视神经胶质瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E8_A7_86_E7_A5_9E_E7_BB_8F_E8_c22_308430.htm 名称视神经胶质瘤所属科室眼科临床表现1．多见于10 岁以下儿童，女性受累较多；2．眼球突出：是较早必然出现的症状，一般为中度突出，不能复位；3．视力减退：一般出现于突眼之前，为视神经纤维遭瘤组织压迫之故；4．眼底改变：眼底征象决定于肿瘤部位，如距眼球后稍远处，则出现原发性视神经萎缩，如紧靠眼球的视神经处，因压迫视网膜中心静脉，可引起视乳头水肿，伴有明显渗出、出血、静脉怒张，象中心静脉阻塞一样改变；5．视野改变：由于视神经干受累而引起各种形态视野缩小，如视交叉受累则可出现偏盲；6．斜视：因视神经受压致视力丧失，或是眼肌受压迫造成；7．CT：由于肿瘤起源于眶内段或颅内段，二者可互助延伸，使视神经扩大，因此，经CT 扫描或X线摄片检查可发现，一般认为视神经孔大6.5-7mm或较对侧大1mm以上，可视为神经孔扩大。治疗早期手术切除肿瘤，局限于眶内，采用外侧开眶术摘除肿瘤；眶颅相沟通肿瘤，则采用额颅径路摘除肿瘤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com