

磺苄西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_E7\\_A3\\_BA\\_E8\\_8B\\_84\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308443.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022_E7_A3_BA_E8_8B_84_E8_A5_BF_E6_c22_308443.htm) 药品名称磺苄西林药物别名磺苄青霉素、磺西林、可达西林、格达西林 Kedacillin , 英文名称Sulbenicillin 类别抗痛风药说明注射剂：1.0g (100万单位)、2.0g (200万单位)、4.0g (400万单位)。用法用量本品可供肌注、静注或静滴，成人剂量，一般2g ~ 4g/日，严重者8g ~ 13g/日，分次进行。儿童，每日40mg ~ 100mg/kg，分次给予。注意事项有青霉素类药物过敏史或青霉素皮肤试验阳性患者禁用。1. 使用本品前需具体询问药物过敏史并进行青霉素皮肤试验，呈阳性反应者禁用。2. 对一种青霉素过敏者可能对其他青霉素类药物、青霉胺过敏，有青霉素过敏性休克史者约5% ~ 7%可能存在对头孢菌素类药物交叉过敏。#093. 尚缺乏孕妇应用本品的安全性资料，孕妇应仅在确有必要时使用本品。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)