

阿司米星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_BF\\_E5\\_8F\\_B8\\_E7\\_B1\\_B3\\_E6\\_c22\\_308461.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E9_98_BF_E5_8F_B8_E7_B1_B3_E6_c22_308461.htm) 药品名称阿司米星药物别名阿司霉素，福提霉素，武夷霉素，强壮霉素

，FORTIMICIN 英文名称Astromicin 类别抗痛风药说明注射用硫酸阿司米星：每瓶200mg用法用量成人1日400mg，分为2次肌注，以灭菌注射用水或等渗氯化钠溶液溶解后用。注重事项（1）与其他氨基糖苷类抗生素相比，耳毒性和肾毒性较轻，但仍应注重，遇有异常应停药。（2）偶致过敏，表现为皮疹、荨麻疹，瘙痒、红斑、发热等，也偶见休克。应予警惕。（3）偶见肝脏损害，遇有肝酶、血清胆红素升高等异常，应即停药。（4）少见消化道症状，如恶心、呕吐、腹泻、口炎等，也有维生素B、K缺乏的报告。偶见白细胞减少。（5）注射部位局部偶见疼痛和硬结。（6）肝、肾功能不良，高龄和严重虚弱者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)