

头孢泊肟酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E6\\_B3\\_8A\\_E8\\_c22\\_308480.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_B3_8A_E8_c22_308480.htm) 药品名称头孢泊肟酯 药物别名施博 Banan，Cepodem 英文名称Cefpodoxime Proxetil 类别抗痛风药说明本品为浅橙色的薄膜包衣片。用法用量剂量，成人100mg(效价)/次，2次/日，饭后服。成人上呼吸道感染包括急性中耳炎、鼻窦炎、扁桃体炎和咽喉炎等：100 mg，一日二次，疗程5-10天；下呼吸道感染：慢性支气管炎急性发作：200 mg，一日二次，疗程10天；急性社区获得性肺炎：200 mg，一日二次，疗程14天；单纯性泌尿道感染：100 mg，一日二次，疗程7天；急性单纯性淋病：单剂200 mg；皮肤和皮肤软组织感染：400 mg，一日二次，疗程7-14天。儿童急性中耳炎：10 mg/kg一日一次，或5 mg/kg一日二次（每日最大剂量不超过400 mg一日一次，或200mg一日二次），疗程10天。扁桃体炎、鼻窦炎：10 mg/kg /天（最大剂量不超过200 mg/天，分2次服用），疗程5-10天。用药过量：未有药物过量报道。药物过量可能有以下症状：恶心，呕吐，腹泻，上腹不适。由药物过量引起的严重毒性反应，肾功能许可的情况下，可用血透和腹膜透析以降低体内头孢泊肟的血清浓度。用药须知本品宜饭后服用。注重事项对青霉素过敏者慎用。被诊断为伪膜结肠炎的腹泻患者，过敏体质的患者，以及应用利尿剂的病人慎用。与其它抗生素一样，长期使用头孢泊肟酯可能会引致非敏感微生物（例如念珠菌，肠球菌，艰难梭状芽胞杆菌）过度生长，因而可能需要中断治疗。曾有因使用抗生素而出现伪膜结肠炎的报告，因而在使用抗生素期间或之后发生严重腹泻的病人应考虑这种

诊断的可能。已知头孢菌素类药物可引起Coombs 直接反应阳性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)