

头孢吡肟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_90_A1_E8_c22_308484.htm 药品名称头孢吡肟
药物别名马斯平、头孢匹美 Maxipime 英文名称Cefepim 类别
抗痛风药说明注射剂粉针剂：500 mg/瓶，1.0 g/瓶。用法用量
成人1g~2g/次，1~2次/日。肌注或静注，亦可静滴。可用本品0.5g~2.0g溶于生理盐水或等渗葡萄糖液100ml中作静脉滴注。
成人及13岁以上的儿童 常用剂量为1g，每12小时静脉滴注或深层肌肉（如外侧股四头肌或臀肌群）注射1次，疗程一般为7-10天。严重感染患者的疗程可延长。轻、中度泌尿道感染 500 mg -1 g，每12小时静滴或肌注1次。除泌尿道感染以外的其他轻、中度感染 1 g，每12小时静滴或肌注1次。严重感染 2 g，每12小时静滴1次。极严重或威胁生命的感染 2 g，每8小时静滴1次。肾功能不全者 肌酐清除率lt.50 mL/分以下者，应延长给药间隔时间和减少用量。在血清肌酐水平已知时，肌酐清除率可根据下列方法计算：男性：肌酐清除率（mL/分）#091.体重（kg）x（140-年龄）lt.246#091.72 x 血肌酐值（mg/dL）].；女性：0.85 x 上述公式。接受血透的患者透析开始时，体内马斯平量的68%将在血透3小时内被排出。因此每次透析结束后应再次用药，剂量与透析前相同。连续接受腹膜透析治疗的病人剂量与正常推荐剂相同，即根据感染严重程度使用 500 mg、1 g 和 2 g，但每次用药间隔为18小时。注重事项禁用于对头孢吡肟或L-精氨酸、头孢菌素类药物、青霉素或其他 -内酰胺类抗菌素过敏的病人。应该确定患者是否有头孢吡肟、其他头孢菌素类药物、青霉素或其他 -内酰胺类抗菌素过敏史。对于任何有过敏，非凡是药物

过敏史的患者应谨慎。如发生马斯平过敏反应，应立即停药，严重者需用肾上腺素和其他支持治疗。已有许多广谱抗菌药诱发伪膜性肠炎的报道，在用本药治疗期间患者出现腹泻时，应考虑伪膜性肠炎发生的可能性。对轻度肠炎病例，仅停用药物即可；中、重度病例需进行非凡治疗。如在治疗期间发生二重感染，应采取适当措施。对妊娠和哺乳的影响 动物生殖试验未显示头孢吡肟对生殖力或胚胎有任何作用，但在孕妇中未开展过任何试验，所以仅在非常必要时，孕妇才可使用此药。马斯平以极低浓度自人乳分泌，哺乳期妇女应慎用此药。对儿童的影响 头孢吡肟对13岁以下儿童的疗效尚不明确。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com