

头孢匹胺钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_8C\\_B9\\_E8\\_c22\\_308490.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_8C_B9_E8_c22_308490.htm) 药品名称头孢匹胺钠 英文名称Cefpiramide Sodium 类别抗痛风药说明0.5g；1g用法用量成人剂量1g～2g/日，分2次给药，肌注、静注或静滴。小儿每日30mg～80mg/kg，分2～3次。视病情成人可增至4g/日，小儿每日150mg/kg。静注时用注射用水，生理盐水或等渗葡萄糖注射液溶解后缓慢推注；静滴一般在30～60分钟内完成。肌注时，以0.5%利多卡因注射液3ml溶解本品0.5g。注重事项有皮疹、荨麻疹、瘙痒及发热等过敏症状。过敏性休克、伪膜性肠炎罕见。偶见过敏性休克，急性肾衰等严重的肾功能障碍，伪膜性结肠炎等伴有血便的严重结肠炎，间质性肺炎，嗜酸性粒细胞浸润综合征。其他不良反应还有变态反应，血液中有时出现粒细胞减少、嗜酸性白细胞增多，偶见贫血、血小板减少，肝脏中有时出现ALT、AST、AL-Pase、LDH升高，偶见胆红素和γ-GTP升高，消化系统症状，二重感染，维生素缺乏症及其他症状。对本品有过敏史者禁用，肝、肾功能障碍者，剂量应适当调节。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)