

头孢呋辛钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_B4\\_E5\\_AD\\_A2\\_E5\\_91\\_8B\\_E8\\_c22\\_308514.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_91_8B_E8_c22_308514.htm) 药品名称头孢呋辛钠  
药物别名头孢呋肟，ZINACEF 英文名称Cefuroxime Sodium  
类别抗痛风药说明注射用头孢呋辛钠：每瓶0.75g；1.5g。用法用量肌注或静注，成人：1次750～1500mg，1日3次；对严重感染，可按1次1500mg，1日4次。应用于脑膜炎，1日剂量在9g以下。儿童：平均1日量为60mg/kg，严重感染可用到100mg/kg，分3～4次给予。肾功能不全者按患者的肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率>20ml/分者，每日3次，每次0.75～1.5g；10～20ml/分者每次0.75g，1日2次；<10ml/分者每次0.75g，1日1次。肌注：1次用0.75g，加注射用水3ml，振摇使成混悬液，用粗针头作深部肌注。静脉给药：每0.75g本品，用注射用水约10ml，使溶解成澄明溶液，缓慢静注或加到墨菲氏管中随输液滴入。注重事项肌注或静注，成人：1次750～1500mg，1日3次；对严重感染，可按1次1500mg，1日4次。应用于脑膜炎，1日剂量在9g以下。儿童：平均1日量为60mg/kg，严重感染可用到100mg/kg，分3～4次给予。肾功能不全者按患者的肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率>20ml/分者，每日3次，每次0.75～1.5g；10～20ml/分者每次0.75g，1日2次；<10ml/分者每次0.75g，1日1次。肌注：1次用0.75g，加注射用水3ml，振摇使成混悬液，用粗针头作深部肌注。静脉给药：每0.75g本品，用注射用水约10ml，使溶解成澄明溶液，缓慢静注或加到墨菲氏管中随输液滴入。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)