

头孢拉定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_8B_89_E5_c22_308519.htm

药品名称头孢拉定
药物别名头孢环己烯，先锋霉素，VELOSEF 英文名

称Cefradine 类别抗痛风药说明胶囊剂；每胶囊0.25g；0.5g。

干混悬剂：0.125g；0.25g。注射用头孢拉定（添加碳酸钠）

：每瓶0.5g；1g。注射用头孢拉定A（添加精氨酸）：每

瓶0.5g；1g。用法用量抗菌性能类似头孢氨苄，对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷白杆菌、流感嗜血杆菌等有抗菌作用。空腹口服250mg或500mg，平均血药峰浓度于1小时内到达，分别为9或16.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。食物延迟本品吸收，但不影响吸收总量。90%药物在6小时内以原形由尿排泄，口服250mg后，尿药峰浓度可达1600 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。本品的肾毒性较稍微。静注本品1g，5分钟时血药浓度为86 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ；15分钟为50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ；30分钟为26 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ；1小时为12 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ；到4小时为1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 。用于呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织等部位的敏感菌感染，注射剂也用于败血症和骨感染。注重事项（1）对青霉素过敏或有过敏体质者及肾功能不全者慎用。对头孢类抗生素过敏者禁用。（2）注射剂刺激性较低，适宜于肌注应用。（3）可致菌群失调、维生素缺乏、二重感染等副作用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com