

头孢唑林钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E5_94_91_E6_c22_308522.htm 药品名称头孢唑林钠
药物别名先锋霉素 英文名称Cefazolin Sodium 类别抗痛风药
说明注射用头孢唑林钠：每瓶0.5g。用法用量肌内或静脉注射，1次0.5～1g，1日3～4次。革兰阳性菌所致轻度感染：1次0.5g，1日2～3次；中度或重症感染：1次0.5～1g，1日3～4次；极重感染：1次1～1.5g，1日4次；泌尿系感染：1次1g，1日2次。儿童1日量为20～40mg/kg，分3～4次给予；重症可用到1日100mg/kg。新生儿1次不超过20mg/kg，1日2次。注意事项（1）青霉素过敏者、肝、肾功能不全者慎用。（2）肌注偶可引起局部疼痛，静注少数病人可引起静脉炎。（3）少数病人可致氨基转移酶升高、尿素氮升高和蛋白尿、白细胞或血小板减少、抗人球蛋白试验阳性、药疹、药物热、嗜酸性细胞增高，也可致念珠菌的二重感染。（4）有的供肌注的注射剂内含利多卡因，不可注入静脉。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com