

四环素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_9B_9B_E7_8E_AF_E7_B4_A0_c22_308551.htm 药品名称四环素 英文名称Tetracycline 类别抗痛风药说明片剂：每片0.125g；0.25g。胶囊剂：每胶囊0.25g。注射用盐酸四环素：每瓶0.125g；0.25g；0.5g（1mg=.盐酸四环素1000单位）。用法用量（1）口服成人1日3~4次，1次0.5g；8岁以上小儿1日30~40mg/kg，分3~4次用。（2）静滴：1日1g，分1~2次。加入到5%~10%葡萄糖输液中，浓度约0.1%，滴注，现已少用。注重事项（1）四环素盐酸盐的水溶性好，口服吸收快，生物利用度比四环素碱好，并有杂质较少的优点。但盐酸盐对消化道的刺激性较大，服药时应多饮水，并避免卧床服药，以免药物滞留食管，形成溃疡。（2）四环素宜空腹服用。食物可阻滞本品的吸收，使生物利用度显著下降。（3）四环素保管不当或过期变质，生成有毒性的差向四环素，不可再用。（4）孕妇、授乳妇女及8岁以下儿童禁用，肝、肾功能不全者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com