

棕榈氯霉素（B型）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_A3_95_E6_A6_88_E6_B0_AF_E9_c22_308555.htm 药品名称棕榈氯霉素

（B型）药物别名无味氯霉素 英文名称Chloramphenicol

Palmitate（Polymorph B）类别抗痛风药说明本品为白色片

：50mg。矫味剂的颗粒剂：0.1g。混悬液：1ml：25mg。用法

用量用途与氯霉素相同，仅供口服。口服。成人一日1.5～3g

，分3～4次服用；小儿按体重一日25～50mg/kg，分3～4次服用；

新生儿一日不超过25mg/kg，分4次服用。#093.本品无特

异性拮抗药，药物过量时应给予对症和支持治疗，如洗胃、

催吐、补液及大量饮水等。注重事项对本品过敏者禁用。1

．由于可能发生不可逆性骨髓抑制，本品应避免重复疗程使用。

2．肝、肾功能损害患者宜避免使用本品，如必须使用时须减量应用并进行血药浓度监测，使其峰浓度在25mg/L以下，谷浓度在5mg/L以下。如血药浓度超过此范围，可增加引起骨髓抑制的危险。3．应空腹服用，即于餐前1小时或餐后2小时服用，以期达到有效血药浓度。4．在治疗过程中应定期检查四周血象，长程治疗者尚须查网织细胞计数，必要时作骨髓检查，以便及时发现与剂量有关的可逆性骨髓抑制，但全血象检查不能猜测通常在治疗完成后发生的再生障碍性贫血。5．对诊断的干扰：采用硫酸铜法测定尿糖时，应用氯霉素患者可产生假阳性反应。6．成人单次剂量不宜超过2g，疗程不宜大于2周。#093.1．由于氯霉素可透过血-胎盘屏障，对早产儿和足月产新生儿均可能引起毒性反应，发生灰婴综合征，因此妊娠期患者不宜应用本品。2．本品自乳汁

分泌，有引致哺乳婴儿发生不良反应的可能，包括严重的骨髓抑制反应，因此本品不宜用于哺乳期妇女，必须应用时应暂停哺乳。 #093.新生儿由于肝脏酶系统未发育成熟，肾脏排泄功能差，药物自肾排泄较成人缓慢，故氯霉素应用于新生儿易导致血药浓度过高而发生毒性反应（灰婴综合征），故新生儿不宜应用本品，必须应用本品时，如有条件应在监测血药浓度条件下使用。 #093.老年患者组织器官大多退化，功能减退，自身免疫功能亦降低，氯霉素可致严重不良反应，故老年患者应慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com