

恒定性外斜视 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E6\\_81\\_92\\_E5\\_AE\\_9A\\_E6\\_80\\_A7\\_E5\\_c22\\_308560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E6_81_92_E5_AE_9A_E6_80_A7_E5_c22_308560.htm) 名称恒定性外斜视所属科室眼科临床表现 恒定性外斜视的临床表现，取决于其病因。可以是间歇性外斜视失去代偿，或一眼视力不好而发生外斜，即知觉性外斜视；或婴幼儿内科，手术做得迟，没有融合，而逐渐发展成外斜。应行全面检查，测量看远及看近斜视度，A-V征及侧位非共同性，此点很重要，因为有过短危险，检查注视性质，眼状肌麻痹验光，有无弱视。治疗

- 1.矫正屈光不正 远视 2.00D 3.00，可酌情不给，5.00D 6.00可酌情减少2~3D，无论远视散光或近视散光应矫正。
- 2.治疗弱视。
- 3.正位视练习。
- 4.手术治疗 年龄超过6个月的患儿，如有恒定性外斜，应手术治疗，主要目的是尽可能恢复双眼单视，如一只眼弱视，建立双眼视无望，则手术目的仅为美容，术前勿需做其他治疗，随年龄增长，外斜有加大趋势，手术可在12岁以后做。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)