

硫酸依替米星 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_c22\\_308566.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E4_BE_9D_E6_c22_308566.htm) 药品名称硫酸依替米星  
药物别名爱大霉素 E-402、89-07 英文名称etimicin sulfate 类别抗痛风药  
说明粉针剂：50mg(5万单位)、100mg(10万单位)/瓶  
用法用量静脉滴注。成人推荐剂量：对于肾功能正常泌尿系统感染或全身性感染的患者，bid，0.1～0.15g/次，稀释于100ml的灭菌生理盐水或5%葡萄糖注射液中，静滴，滴注1h。一般疗程5～10d，或200～300mg溶于5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水100ml中静滴1h，qd。疗程5～10d，病情严重或败血症者可适当延长疗程，必要时可与β-内酰胺类或其他抗生素联合应用。对于肾功能不良者，原则上不用，必要时调整剂量，并应监测血清中依替米星的浓度。注重事项  
对本品及其他氨基糖苷类抗生素过敏者禁用。在用本品治疗过程中仍应密切观察肾功能和第八对颅神经功能的变化，尤其是已明确或怀疑有肾功能减退者、大面积烧伤者、老年患者或脱水患者。本品应避免与其他具有潜在耳、肾脏毒性如多粘菌素、其他氨基糖苷类等抗生素、强利尿酸及呋塞米(速尿)等联合使用，以免增加肾毒性和耳毒性。可能发生神经肌肉阻断现象，因此对接受麻醉剂、琥珀胆碱、筒箭毒碱或大量输入枸橼酸抗凝剂的血液患者应非凡注重，一旦出现神经肌肉阻滞现象应停用本品，静脉内给予钙盐进行治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)